

PRIMĂRIA COBADIN		
INTRARE	Nr.	15945
IEȘIRE		
Zi	Luna	An
15	10	2026

COMP. ACRON



OFICIUL FITOSANITAR CONSTANȚA
 Str. Celulozei Nr. 3 Bis Constanța,
 Jud. Constanța, Tel. : 0787605492,
 Email : ofconstanta@anf.ro

ANEXA 6

Către:
 Primăriei/ Societăți
 Nr. 1756/ 15.10.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 20

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare la rapiță : Puricele negru al rapiței (Phyllotreta atra), Viespea rapiței (Athalia rosae), Putregaiul negru(Phoma l.)

1. Puricele negru al rapiței (Phyllotreta atra)

Este o specie întâlnită frecvent în toate regiunile în care se cultivă crucifere. Iernează ca adulții în resturile vegetale rămase după recoltare, în statul superficial al solului și depun ouăle grupat sau izolat, primăvara (aprilie – mai) în jurul plantelor tinere. Adulții au corpul alungit, de culoare neagră cu luciu albastru-verzui și lungimea de 2-3 mm. Pagubele cele mai importante sunt provocate de adulți, pentru că atacă agresiv încă din faza de cotiledoane, imediat după înființarea culturii de rapiță, continuând pe toată perioada de vegetație. Semnele atacului se observă sub formă de orificii dispuse preponderent pe marginea limbului foliar, ceea ce conferă frunzei un aspect ciuruit.

2. Viespea rapiței (Athalia rosae)

Este unul din cei mai periculoși dăunători oligofagi al culturilor din familia Brassicaceae și este întâlnit în toate regiunile din România.

Adultul are capul negru, lucios, toracele și abdomenul portocaliu-roșcat, iar aripile galbene la bază cu nervuri și margini negricioase. Larva este cenușiu-verzuie, cu cap mic, rotund, negru și picioare abdominale. Această specie are două generații pe an și iernează în sol, ca larvă protejată de un cocon, iar adulții primei generații apar în lunile aprilie- mai. După un scurt timp de hrănire pe flori și frunze, adulții se împerechează și depun ouă, care eclozează după 8-15 zile. Larvele coboară în sol după circa 25-50 zile pentru a se împupa și spre sfârșitul verii apar adulții celei de-a doua generații. Larvele provenite de la adulții din generația de toamnă sunt cele mai distructive, datorită faptului că atacă culturile tinere de rapiță în primele faze de vegetație, afectând grav plantele de rapiță și ducând la pierderi ale producției chiar și de peste 60%. Larva viespei consumă frunzele, bobocii floralii, florile, mugurele terminal și chiar păstăile tinere. În prima fază, larva preferă epiderma inferioară a frunzelor de rapiță, trecând apoi și la cea superioară, în final rămânând doar limbul frunzelor, sau pețiolul. Semnele atacului se pot observa pe frunze, unde apar mici perforatii, care se măresc în timp ce atacul continuă. Atacul masiv poate duce la scheletizarea plantelor urmată de uscarea acestora.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele :

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| 1. MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) | 0,15 kg/ha | sau |
| 2. INAZUMA (LUTADOR) | 0,15 -0,2 kg/ha | sau |
| 3. DELMETROS 100 SC/KORON 100SC | 0,05 l/ha | sau |
| 4. POLECI (DECA 2,5 EC) | 30-50 ml/ha | sau |

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament : în faza fenologică a culturii de 4-8 frunze.

3. Putregaiul negru (Phoma l.)

Este una dintre cele mai răspândite boli ale culturii de rapiță și este provocată de ciuperca *Leptosphaeria maculans*. Se transmite prin resturi vegetale infectate sau semințe contaminate. Infecția inițială se manifestă simptomatic toamna, prin apariția de pete relativ circulare, izolate de culoare alb-cenușiu, punctate cu formațiuni negre pe frunzele tinere. Evoluția continuă primăvara, când agentul patogen atacă toate organele plantei, inclusiv rădăcina și opresc circulația elementelor nutritive în plantă, iar în final plantele se înnegresc și se usucă.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele :

- | | | |
|---|-----------------|------------|
| 1.FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) | 0,5 l/ha | sau |
| 2.SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC) | 0,5 l/ha | sau |

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament : la răsărirea culturii.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor, atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

ANUNȚAȚI TRATAMENTUL LA PRIMĂRII ȘI APICULTORI!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor (pesticide), normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor în conformitate cu:

Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor (SMR 10), agriculturii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecția plantelor au următoarele obligații: